



## おおた小児科ワクチン接種・乳幼児検診推奨スケジュール

<適期に効率良く接種するモデルケース>

2ヶ月	ロタ①	B型肝炎①	肺炎球菌①	五種混合①			
3ヶ月	ロタ②	B型肝炎②	肺炎球菌②	五種混合②		3ヶ月健診	DPT:三種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風) IPV:不活化ポリオワクチン DPT-IPV:四種混合 五種混合:四種混合+ヒブ(インフルb型)
4ヶ月			肺炎球菌③	五種混合③			
5ヶ月					BCG		
6ヵ月			日本脳炎①②	←1~4週あけて2回		↑千葉県では 集団健診と一緒に	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ・10ヶ月健診                      ・B肝③                 </div>
8ヶ月							
9ヶ月							
10ヶ月	1才までに→	B型肝炎③				10ヶ月健診	
11ヶ月							
1才	水痘①	麻疹風疹①	肺炎球菌④	五種混合④	*おたふく①		1才すぐに 5本同時接種がお勧め
1才6ヶ月	水痘②		日本脳炎③			1才半健診	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ・1才半個別健診(集団健診後)                      ・水痘②                 </div>
	↑①から 3ヶ月~1年後		↑日脳②から 1年後				
2才							
3才						3才健診	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ・3才個別健診(集団健診後)                      ・日脳未接種の場合は開始                 </div>
4才							
5才							
6才(年長)		麻疹風疹②	*おたふく②	*三種混合	*不活化ポリオ		就学前年度の4/1~ 年度の早めに
9才			日本脳炎④	二種に替え三種接種を推奨			9才~13才未満
11才				二種混合	*三種混合		11才~13才未満
小6~	子宮頸がん①②		←15才までは2回(①と②は半年あける) 1回目が15才以上は3回				小6~高校1年 早めがお勧め

横に並べて記載しているワクチンは複数同時接種を推奨しています。  
1才までのワクチンは太ももに接種します。

\*印は任意接種で有料になりますが、いずれも重要なワクチンです。

【おたふく】当院では1才、3才での接種を推奨しております。

【日本脳炎】標準接種は3才からですが、県内で発症例があるため6ヶ月から開始することを推奨しています。

【年長のDPT/IPV(不活化ポリオ)、11才のDPT(三種混合)】抗体維持のため、任意での追加接種を推奨しています。

【髄膜炎菌ワクチン】海外赴任、留学等海外に居住したり、国内でも寮生活、国際試合参加などの場合に推奨します。

<あくまでモデルケースです。これからはずれても接種できる場合も多いのでご相談ください。>

### VPD=ワクチンで予防できる病気

は多くの病気の中のごくわずかです。

かかると治療がなく、重症化、死亡、重い後遺症が残る病気です。

予防できる病気はワクチンで予防しましょう。

最新、詳細な  
ワクチン情報は【VPD】で検  
索！

